



Patiënteninformatie

Therapie RITUXIMAB (MABTHERA®)

Inhoud

Inhoud	2
Inleiding.....	3
Omschrijving van uw therapie MABTHERA®	3
Wat is Mabthera®?.....	3
Hoe wordt Mabthera® toegediend?	3
Waar wordt Mabthera® toegediend?	4
Belangrijk om weten bij Mabthera®	5
Allergische reactie	5
Mogelijke daling van de bloeddruk.....	5
Zwangerschap.....	5
Gebruik van andere geneesmiddelen	5
Tot slot	6
Wie contacteren bij vragen of problemen?	6
Persoonlijke notities / vragen	7

Inleiding

Deze brochure biedt u de nodige informatie over uw therapie MABTHERA®. U leest hierin meer over de behandeling zelf, bijzondere richtlijnen en mogelijke nevenwerkingen van de therapie. We geven u tips om met deze nevenwerkingen om te gaan en we zetten op een rij in welke gevallen u de huisarts of de verpleegafdeling moet contacteren.

Het is onmogelijk om in deze brochure alle details voor elke situatie te beschrijven. Aarzel daarom niet om zo nodig bijkomende vragen te stellen aan uw arts of verpleegkundige.

Gelieve deze brochure mee te brengen als u naar het ziekenhuis komt.

Omschrijving van uw therapie MABTHERA®

Wat is Mabthera®?

Mabthera® is een antilichaam. De werkzame stof van Mabthera® is Rituximab. Rituximab is een soort eiwit dat bindt aan het oppervlak van een type witte bloedcel, de B-lymfocyt. Wanneer Rituximab aan het oppervlak van deze cel bindt, zorgt het ervoor dat de cel afsterft. Mabthera® wordt vaak bij niet kwaadaardige aandoeningen gegeven zoals reuma, de ziekte van Wegener, ITP (Immuun Trombopenie Purpura),

Hoe wordt Mabthera® toegediend?

Het geneesmiddel Mabthera® wordt toegediend in de vorm van een infuus of subcutane inspuiting (onderhuids).

De eerste toediening is altijd via een infuus onder monitoring en zal trager gegeven worden dan de volgende toedieningen omwille van eventuele allergische reacties die kunnen optreden.

Als alles goed is verlopen kan je vanaf de tweede therapie in overleg met de arts omschakelen naar een subcutane inspuiting of de infusen verder zetten .

Regelmatig vindt er een controle plaats van de bloeddruk, het hartritme en de temperatuur.

Mabthera® wordt vaak gebruikt in combinatie met chemotherapie. Mabthera® wordt dan voor of na de chemotherapie toegediend.

Waar wordt Mabthera® toegediend?

U zult de therapie altijd in het ziekenhuis toegediend krijgen.

De 1^{ste} 2 toedieningen gebeuren meestal op de oncologische hospitalisatie – afdeling omwille van eventuele allergische reacties die kunnen optreden.

Verdere behandeling kan in het dagziekenhuis gebeuren. Overnachting is dan niet nodig.

Belangrijk om weten bij Mabthera®

Allergische reactie

Als u wordt behandeld met Mabthera® kunnen reacties, zoals koorts, ademhalingsmoeilijkheden, rillingen, huiduitslag en bloeddrukverlaging optreden. Deze verschijnselen treden voornamelijk op bij de eerste toediening.

Voor elke toediening van Mabthera® zult u een geneesmiddel krijgen om koorts te voorkomen of te verminderen (Dafalfan®) en een geneesmiddel om allergie te voorkomen (Cetirizine®).

Tijdens de eerste toediening worden uw bloeddruk en hartritme goed gevolgd. Ook uw temperatuur wordt zeer regelmatig gecontroleerd. In het geval dat bij u een reactie ontstaat, zal uw arts de infusie vertragen of onderbreken en een passende behandeling instellen. Na verbetering van de symptomen kan de infusie worden voortgezet.

Bij de volgende toedieningen zijn de risico's op de mogelijke reacties kleiner.

Mogelijke daling van de bloeddruk

Door een mogelijke daling van de bloeddruk bij het begin van de behandeling, kan de arts patiënten die geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk gebruiken, aanraden 12 uur voor de Mabthera® deze inname te stoppen.

Zwangerschap

Vrouwen in de vruchtbare periode mogen niet zwanger geraken tijdens en tot 1 jaar na de behandeling met Mabthera®.

Gebruik van andere geneesmiddelen

Meld uw arts als u andere geneesmiddelen gebruikt (inclusief de middelen die niet door uw dokter zijn voorgeschreven). Dat is zeer belangrijk omdat door het gelijktijdig gebruik van meer dan één geneesmiddel de werking van Mabthera® versterkt of verzwakt kan worden. Daarom mag Mabthera® niet samen met andere geneesmiddelen gebruikt worden zonder de toestemming van uw arts.

Tot slot

De hierboven vermelde bijwerkingen zijn de meest voorkomende bijwerkingen voor deze behandeling. Hoe u deze bijwerkingen beleeft, is erg persoonlijk. Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen, anderen weer niet. Aarzel niet uw (huis)arts of (thuis)verpleegkundige te contacteren bij vragen rondom andere bijwerkingen die u ervaart of andere vragen, gevoelens en eventuele onzekerheden.

Wie contacteren bij vragen of problemen?

Centrum voor oncologie - AZ Turnhout
Campus Sint-Elisabeth
Rubensstraat 166, 2300 Turnhout

Oncologisch dagziekenhuis 014 40 60 01

Oncologie hospitalisatie 014 40 65 00

AZ Turnhout vzw

www.azturnhout.be

info@azturnhout.be



Blijf op de hoogte via www.facebook.com/azturnhout



Campus Sint-Jozef

Steenweg op Merksplas 44

2300 Turnhout

014 40 60 11



Campus Sint-Elisabeth

Rubensstraat 166

2300 Turnhout

014 40 60 11